

Fiche d'exercices : Applications

Exercice 1 : On considère l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^4.$$

- Déterminer $f(A)$ lorsque A vaut $[-2, 1]$, $\{0, 1\}$ et $\{-1, 1\}$.
- Déterminer $f^{-1}(B)$ lorsque B vaut $[0, 2]$, $[-1, 4]$, $[-2, -1]$, $[1, 4]$ et $\{3\}$.
- La fonction f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 2 : Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$f(x) = -2x^2 + 1.$$

Déterminer les ensembles images $f(\mathbb{R})$, $f([2, 3])$ et $f([-1, 1])$ ainsi que les préimages $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(\{1\})$ et $f^{-1}(\mathbb{R}_-)$.

Exercice 3 : Les applications suivantes sont-elles injectives ? Surjectives ? Bijectives ?
Donner l'application réciproque dans les cas où l'application est bijective.

- (a) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, n \longmapsto 2n$; (b) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, n \longmapsto -n$
 (c) $\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, n \longmapsto n + 1$; (d) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, n \longmapsto n + 1$
 (e) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x^2$; (f) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+, x \longmapsto x^2$

Exercice 4 : Les applications suivantes sont-elles injectives ? Surjectives ? Bijectives ?

- (a) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{2x}{x^2 + 1}$;
 (b) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto 4x^3 + x$.

Exercice 5 : Soient $f : E \rightarrow G$ et $g : G \rightarrow G$ deux applications, montrer que :

- $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ;
- $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.

Montrer que si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective et que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 6 : Soit $f : E \rightarrow G$ une application. Montrer que :

- f est injective si et seulement si pour tout $A \subset E, f^{-1}(f(A)) = A$.
- f est surjective si et seulement si pour tout $B \subset F, f(f^{-1}(B)) = B$.

Fiche d'exercices : Applications

Exercice 7 : Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \mapsto \mathbb{R} \setminus \{2\}$ l'application définie par :

$$f(x) = \frac{2x + 5}{x - 1}.$$

Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque f^{-1} .

Exercice 8 : Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ l'application définie par :

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque.

Exercice 9 : Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application de E dans l'ensemble de ses parties. On considère

$$A = \{x \in E, x \notin f(x)\}.$$

- Montrer $A \notin \text{Im}(f)$;
- En déduire que f n'est pas surjective.

Exercice 10 : On dit qu'un ensemble A est fini s'il existe un entier naturel n et une bijection de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans A . L'entier n est unique et est appelé le cardinal de A , noté $\text{card}(A)$.

Soient A et B deux ensembles finis, montrer que l'on a $\text{card}(A) = \text{card}(B)$ si et seulement si il existe une bijection de A dans B .

Soient A et B deux ensembles finis, montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- Il existe une application injective de A dans B .
- Il existe une application surjective de B dans A .